

DR DAVID DICKNER #16758
 GMF RICHELIEU, 300 RUE DU PARADIS
 SOREL-TRACY, QC, J3P 3G8
 TÉL. (450) 742-0485

VACCINATION SANTÉ
 690, BOUL. DE MONTBRUN, LOCAL K
 BOUCHERVILLE, QC, J4B 8H2
 TÉL. (450) 655-3341 FAX (450) 655-2261

ORDONNANCE COLLECTIVE

INITIATION D'UNE ANTIBIOTHÉRAPIE DANS LE TRAITEMENT D'UN **INCONFORT URINAIRE** CHEZ LE PATIENT ADULTE

Émetteur	Dr David Dickner – Licence #16758
Date d'entrée en vigueur	29-08-2016
Date de modification	01-12-2019
Date de révision prévue	01-12-2021

RÉFÉRENCE : INESS, Médicament, antibiotiques, infection urinaire chez l'adulte, octobre 2017. L'EXAMEN CLINIQUE dans la pratique infirmière Édition ERPI Compétences infirmières p. 69 et p. 518. de Mario Brulé et Lyne Cloutier.

PROFESSIONNELS HABILITÉS À COMPLÉTER LE FORMULAIRE DE LIAISON ET SECTEURS D'ACTIVITÉS VISÉS

Les infirmières habilitées qui possèdent la formation, les connaissances et les compétences nécessaires exerçant à «VACCINATION SANTÉ» Clinique située à Boucherville.

AUTRES PROFESSIONNELS VISÉS PAR L'ORDONNANCE

Les pharmaciens exerçant leur profession sur le territoire du Québec

CRITÈRES DE FORMATION REQUIS À L'APPLICATION DE CETTE ORDONNANCE COLLECTIVE

- Membre en règle de l'OIIQ
- Référence de l'Examen Clinique dans la pratique infirmière de l'OIIQ
- Formation pharmacologique, Justin St-Louis, Pharmacien
- Formation mise à niveau des connaissances Dr David Dickner

GROUPE DE PERSONNES VISÉES OU SITUATION CLINIQUE VISÉE

Patients adultes avec symptômes d'inconfort urinaire bas où il est possible d'avoir un échantillon urinaire.

ÉVALUATION (Voir guide INESS infections urinaires)

- Identifier le médecin traitant.
- Évaluer le dossier médical (allergies, récurrence, ATCD médicaux et médicamenteux)
- Patients présentant les symptômes suivants: brûlement mictionnel, pollakiurie, dysurie, douleur abdominale basse, urine malodorante, hématurie.
- Identifier les symptômes et signes orientant vers un autre diagnostic : écoulements vaginaux ou pertes vaginales, prurit vulvaire, symptômes de grossesse, douleur prostatique ou testiculaire.
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.

CONTRE-INDICATIONS – ORIENTATION VERS LE MÉDECIN

- Bactériurie asymptomatique (ne doit pas être traitée).
- Femme enceinte.
- Diabétique avec diabète non contrôlé.
- ATCD d'infection aux reins; pyélonéphrite dans les 10 dernières années.
- État d'immunosuppression (cortisone orale, médicaments immunomodulateurs, VIH).
- Patiente avec anomalie du système urinaire.
- Porteuse de sonde urinaire ou cathéter urinaire.
- Symptômes suggérant une infection plus grave (fièvre, douleur vive au dos ou au bas du ventre, vomissements, altération de l'état général, punch rénal positif).
- Infection urinaire qui survient plus de 2 fois par 6 mois ou plus de 3 fois par année.

TEST DE DIAGNOSTIC

NITRITES : Zone réactive blanche après 60 secondes (négatif)
Zone réactive rose après 60 secondes (positif)

ET/OU

LEUCOCYTES : Zone réactive beige après 120 secondes (négatif)
Zone réactive tend vers le mauve après 120 secondes (positif)

INTENTION THÉRAPEUTIQUE

Si bâtonnet réactif positif soit leucocytes et/ou nitrites

TRAITEMENT DES INCONFORTS URINAIRES NON COMPLIQUÉS CHEZ LA FEMME

ANTIBIOTIQUE DE 1 ^{ÈRE} INTENTION	POSOLOGIE ORALE	DURÉE
Nitrofurantoïne (Macrobid)	100 mg PO BID	5 jours
Fosfomycine (Monurol)	3 g PO	En dose unique
Triméthoprim-sulfaméthazole ou TMP-SMX (Bactrim DS)	160/80 mg PO BID (1 comprimé DS)	3 jours

TRAITEMENT DES INCONFORTS URINAIRES COMPLIQUÉS CHEZ L'HOMME

ANTIBIOTIQUE	POSOLOGIE ORALE	DURÉE
Ciprofloxacine (Cipro)	500 mg PO BID	10 jours

PROCÉDURES

- Procéder au test de bandelette urinaire et faire un prélèvement mi-jet dans un pot de culture stérile si :
 - Récidive en moins d'un mois
 - Infection urinaire compliquée (chez l'homme)
 - Présence de symptômes persistants ou échec du traitement antibiotique
 - Voyage récent dans une zone de bactéries multirésistantes et symptômes urinaires

et

Une fois les résultats obtenus pour la culture et l'antibiogramme, choisir le traitement contre les bactéries sensibles et initier le traitement.

OU

- Procéder au test de bandelette urinaire.
et
Initier le traitement chez le patient symptomatique qui a un résultat positif aux leucocytes ou aux nitrites.
- **Le suivi** du patient est fait principalement dans les situations suivantes :
 - après une culture d'urine
 - persistance des symptômes malgré la prise du traitement
 - réapparition rapide des symptômes en moins d'un mois

RECOMMANDATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- S'essuyer de l'avant à l'arrière.
- Uriner avant et après les rapports sexuels.
- Uriner fréquemment.
- Boire beaucoup d'eau sauf si contre-indication médicale.
- Jus de canneberge conseillé lors du traitement.
- L'état actuel ne permet pas de recommander les canneberges et probiotiques intra-vaginaux.

INTERVENTIONS DU PHARMACIEN EN APPLICATION DE SON CHAMP D'EXERCICE ET DES ACTIVITÉS QUI LUI SONT RÉSERVÉES :

- Initier la thérapie médicamenteuse selon une ordonnance
- Sur réception du formulaire de liaison pour l'application de l'ordonnance collective, s'assurer qu'il s'applique à une ordonnance collective que le pharmacien détient.
- Analyser la pharmacothérapie de la personne.
- Préparer la médication et la remettre à la personne.
- Fournir à la personne l'information nécessaire sur la médication.

DOCUMENTS À REMETTRE :

- Formulaire de liaison pour l'application de l'ordonnance collective
- Formulaire de l'évaluation de l'infirmière afin de le transmettre au médecin traitant, dans le cas où un suivi médical est nécessaire.


SUIVI MÉDICAL

- Si symptômes d'inconfort urinaire avec contre-indications à l'ordonnance collective.
- Si présence de fièvre et/ou douleur rénale malgré le traitement en cours, voir le médecin dans les 24 heures.

RÉDIGÉ PAR :


 GENEVIÈVE GALLANT, B.SC.INF. #2081545

APPROUVÉ PAR :


 DR DAVID DICKNER #16758

SIGNÉ EN DATE DU _____ 2019-11-30 _____